

39044/p

D. D.

MORBORUM CASUS,

QUORUM

SPECIMEN PRIMUM,

VENIA EXPER. FAC. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

JONASIDRÉN,

M. D. MED. PRACT. PROF. REG. ET ORD.

S. R. S. M.

PRO GRADU DOCTORIS

EXHIBET

Ericus Odhelius,

ART. OBST. ADJUNCT.

IN AUDIT. GUST. MAJ. D. XI JUNII, ANNI MDCCLXXXV,

H. A. ET P. M. S.

UPSALIÆ,

LITTERIS JOHAN. EDMAN, DIRECT. ET REG. ACAD. TYPOGR.

El Sager
Lundi. 1811

MORBORUM CASUS.

I.

Viginti annorum juvenis, graciliore quidem corpore, sed firma valetudine gavisus fuit usque ad annum 1782, quo artificii, in conficiendis speculis occupato, inservire occoepit, ita ut in adglutinando, quod vocant, folio, opera ejus præcipue versaretur. Quo in negotio ubi per annum fere desudaverat, minui sensim vires, quin ab animi affectu insolitos oboriri sentit tremores; ineunte autem vere anni 1784, hi crebriores ac fortiores, matutino in primis tempore & ab animi perturbationibus, reddebantur, ut manus pedesque, uno fere eodemque momento correpti, primum quassari, deinde vero ceteræ quoque corporis partes ita infestari coeperint, ut ne linguæ quidem muscoli immunes fuerint. Aucta dein adeo est tremoris istius violentia, ut certis per diem intervallis labori cuivis impar evaderet, & ab eodem penitus desistere, lectoque detineri versus autumnum tandem cogeretur.

Quum vero die VII Decembris in Nosocomium Regium receptus fuit, totum jam corpus, quietum etiam jacens, parvo sed continuo tremore quati conspiciebatur; ubi autem vel minime sese moveret, summa violentia inque omnes partes miro & ridiculo modo, Mimi instar, sed sine ullo ægrotantis dolore, versari & distrahi videbantur artus. Latus sinistrum totum, robore fere erat destitutum, & defecerant adeo corporis vires, ut in lecto semet convertere, erectumve tenere corpus nequiverit. Universalibus præterea spasmodis quam sæpissime infestabatur

A

tur

tur æger, qui, in sinistro latere primum oborti, & deinde per totum corpus sese dispergentes, frigore prænunciabantur, cui postea eodem ordine spasmi succedebant. Hi graviores modo, modo leviores erant, &, pro suæ violentiæ gradu, majorem minoremve secum ferebant dolorem: quinquies aut sexies adeo fuerunt vehementes, ut Tetano fere viderentur similes, cum capitis dolore, vertigine & leviori febre conjuncti. Sensus, tam internos quam externos, non turbatos semper conservavit miser; neque vitales, neque naturales, morbo licet sæviente, quidquam pati videbantur functiones.

Purgatis, alvum leniter ducentibus, primis viis, in usum vocabatur Extractum Stramonii sub pillulari forma ad gr. IV de die, aucta sensim ad gr. XII dosi; quando autem vespertinis horis sæviebant spasmi, data est Tinct. Thebaica, quæ etiam fecit, ut placide dormire posset ægrotus. His remediis effectum est, ut indies spasmi motusque convulsivi sensim minuerentur, demumque cessarent; neque, sub hac curatione, ulla pupillæ mutatio observata fuit. Die XVI Januarii anni præsentis, una cum usu Stramonii, injunctum est ægro, ut drachmas V pulv. Corticis peruv. quotidie fumeret, unde robur ejus pedetentim ita fuit auctum, ut sine aliorum ope cibum capere, sedere & obambulare posset. Fore, ut æger ad sanitatem rediturus esset, aliqua hinc orta est spes, verum mox fere intercepta, cum die V Febr. acerbus nuntius doloris cujusdam ipsum excruciantis adfertur. Inde enim per aliquot dies adeo debilitatus fuit, ut neque bibere neque incedere, nisi adjutus, potuerit; quid? quod etiam spasmi, de quibus supra mentionem fecimus, illum de novo afficere coeperunt. Usus igitur Chinæ aliquantis per seponere consultum judicabatur, & Stramonium solum adhibere; atque sedatis ex hoc spasmis, ut firmaretur corpus,

pus, ad Corticem Peruv. iterum reversum est, cui dein stillicidium aquæ frigidæ, quod Douches appellant, junctum est, idque eo cum fructu, ut sanitati fere perfecte restitutus æger, nosocomio die X Apr. lætus valedixerit.

Observatio I. Ex morbi descriptione satis patet, ægrum Chorea S. Viti Sydenhamii affectum fuisse, & hanc suam duxisse originem a Mercurio, quo speculorum opifices ad figendum vitris folium utuntur. Haud dissimiles varios alios casus ab eadem causa prognatos, in Nosocomio Regio Holmieni vidit Cel. Ass. Reg. Coll. Med. Odhelius, quos benignissime [mecum communicavit. Non immerito igitur inter morbos artificum referri debet peculiaris hic affectus.

II. Morbo huic medelam allaturi, in diversas sententias abierunt Medici, quisque suam methodum proficuum venditans. Venæ sectiones & iterata laxantia Sydenham, Buchan, Sumeirius pluresque commendant; verum, si adoleverit saltem morbus, nunquam adhiberi debent, in primis quum in ægris, quod ex allato casu patet, & Cel. Bisset recte observavit, paralytici quid jam gliscere videtur. In initio autem, orto præsertim ex obstructione excretionum sangvinearum morbo, necessariam esse interdum sangvinis evacuationem &, ubi fomes mali in primis viis hæret, laxantia, existimamus. Extra hos casus, quæ in Nervos agunt, motus eorum inordinatos, compescendo, præ primis utilia esse, Wetzspreni observationes satis evincunt; stramonium vero reliquis palmam præripere, & præsens casus & plures alii, in Nosocomio Reg. Holm. observati, extra omne fere dubium ponunt. En alius eadem comprobans.

II.

Puella VII annos nata, adversa sæpe laborans valetudine, mense Januario hujus anni, nocte quadam a spectro, sub insomnio obveniente, valde fuit exterrita. Insequentibus diebus insolitos artuum tremores observarunt parentes, qui, de valetudine filiolæ solliciti, Medicum accessi curarunt. Is curatius omnia pensitans, Choream esse S. Viti Sydenhamii, qua ægra afficiebatur, mox intellexit, & quum abdomen valde esset tumidum, vermes in causa esse mali suspicatus est, indeque anthelmintica purgantibus juncta præbuit. Tantum vero abest, ut morbus inde mitigaretur, ut potius augeretur indies; varia igitur nervina & antispasmodica, itidem sine successu, adhibita sunt, & cum ægra, jam alioquin sana, ob continuos spasmos ulterius neque incedere neque bibere sine aliorum auxilio potuerit, ad Stramonium, quod in simili casu aliquoties proficuum percepit medicus, deventum est medio mensis Martii, quo spasmi sensim sensimque sedabantur; integre vero cessarunt firmato, a Corticis peruviani & balneorum frigidorum usu, corpore, ut pristinae valetudini restituta fuerit ægra.

III.

Quatuor & viginti annorum mulier infirmiore valetudine, primum partum editura, ad Nosocomium, quod puerperis aperitur, die XII Febr. hujus anni adportatur. De languore, vomitionibus & spuris doloribus conquesta est; &, exploratione facta, constitit, membranas jam fuisse ruptas, os vero uteri parum patens. Sequenti die p. m. curatorem uteri os permisit inquisitionem, quæ tamen, ob situm foetus elevatiorem, necesse erat, ut tota manu perficeretur: tumque apparuit, pelvim esse constrictiorem, os pubis nimis complanatum, & protuberantiam ossis sacri valde prominentem; compertum præterea

caput infantis dextræ incumbere auri & corpus jace-
re supinum; inque dextra cavitate iliaca positum esse
caput foetus, pedes vero ad sinistram fundi uteri partem.
Cum prævio capite partus perfici non posset, versio ten-
tabatur, quæ in arctissimo jam utero valde erat difficilis;
multo tamen labore id obtrinebatur, ut hora X p. m. ad
caput usque extrahi posset foetus. Minima vero hujus la-
titudine immobilis hæsit inter os pubis ossisque sacri pro-
ruberantiam, nec prius inde, quam hora VI sequentis
diei matutina, post multas molitiones liberari potuit.
Caput foetus hujus, qui puellus, isque demortuus, erat,
Cephalometro Steinii emensum, trium pollicum latitudi-
nem, ubi minima erat, vix habuit *).

Peracto partu, de obscuriore visu conquesta est, qui
meridiem versus ita augebatur, ut eo prorsus privaretur;
supervenit etiam febris, & a potu vomitus. Hæc mala ut
levarentur, amplum nuchæ adplicatum fuit Vesicatorium,
& refrigerantia præscripta. Die XVI Febr. lumen ocu-
lorum redit, febris autem, etsi mitior, cum algore sub-
inde redeunte, & leviori quodam versus noctem delirio,
continuat. Ut Lochiorum succederet fluxus, decoctum
herbarum amarissimæ naturæ in uterum injectum fuit.
Lactis aliquantulum mammæ initio dederunt, sed statim
penitus ita cessavit, ut ne suctu quidem gutta extrahi po-
tuerit. Die XVIII, tempore intercalari, ad Chinæ usum
processum est, sed sine ulla morbi mitigatione; nec per
languorem, indies auctum, fieri potuit, quin die XXI
Febr. vitam relinqueret ægra.

Aperto corpore, insoliti nihil observabatur, usque
dum ad ovarium dextrum perventum fuit, quod suppu-

A 3

ra.

*) Historiam hujus morbi mecum benigne communicavit Ampl.
Prof. Jac. Alm.

ratione destructum videbatur; eodem vitio adfecta inveniebatur, cum tuba ac fimbriis, cellulosa adjacens, quæ, quidquid puris continebant, inter rectum atque uterum in peritonæi plicam effuderunt. Uterus ad naturalem magnitudinem redactus, nulla conceptæ inflammationis signa obtulit; pelvis autem in omnes mensuras arctissima, inter ossis sacri protuberantiam & os pubis, trium ad summum pollicum latitudinem vix æquabat: accessit spina ossea, e symphyssi ossium pubis prominens, quæ distantiam modo dictam ad dimidium pollicis diminuebat.

Obs. I. Omnium certe obstetricanti difficillimum est determinatu, quando, ob male conformatam pelvim, operatio Cæsarea prorsus sit inevitabilis. Perpulchre quidem Auctores Artis obstetriciæ docent, foetu maturo, operationem esse instituendam, cum diameter transversalis duos non multum excedit pollices; quo autem modo mensura hæc adeo adcurate sit investiganda, nondum constat. Horrenda igitur hæcce atque sæpissime lethalis operatio, ante quam manus introductio frustra vel pluries fuerit tentata, me iudice, non est suscipienda; cavendum autem, ne partium mollium coarctationem atque intumescuntiam cum deformitate ossium confundamus, svaedet, cum innumeris aliis, allatus jam casus, ubi diameter supra dictus vix duos pollices & quinque lineas æquabat, atque ubi manus non sine magno molimine utero immitti potuerit.

Obs. II. Quando, adversante adeo Lucina, accidit, ut extracti jam corporis infantilis fixum hæreat caput, consultius certe ducimus, veros dolores ipsiusque naturæ beneficium patienter exspectare, quam majori manuum vi vel instrumentorum ope, quorum funestus sæpissime, semper vero Matri difficillimus est usus, negatam sibimet aperire viam.

IV.

Ancilla L. S. duodeviginti annos nata, tenerioris corporis habitus, in Nosocomium Regium Stockholmien-
se recipiebatur die 14 Februarii. Luxasse se genu, in quo
etiam certis temporum intervallis, quemdam se olim, an-
te novum hoc infortunium, sensisse dolorem, narrabat.
Erat jam femur unacum genu adeo tumidum, ut an, aut
quo loco fractura exstiterit, pervideri non posset; cruris
vero ad femur iusta positio, nullam in genu factam luxa-
tionem satis indicabat. Fomenta resolventia ex oxycra-
to & oleo ceræ ipsi genu adhibebantur, quod, ut iustum
servaret situm, sveto in fracturis modo, deligabatur. Mi-
nuto post aliquot dies tumore, fractura, paullo supra con-
dylos, in femore satis evidenter conspiciebatur.

Ægra, per quatuor hebdomadas immota jacens, ea
qua par erat positione tenebatur, transacto vero eo tem-
pore, lecto levata, & duobus primum, deinde uno bacu-
lo, ibat suffulta, sed continuum, licet leviolem, imprimis
ubi pede niteretur, dolorem sentiebat; mox vero acer-
bior factus, ut leniretur, Emplastrum e Styracē cum
camphora, at frustra, adhibitum est. Quoniam vero
versus noctes intensissimus erat, & os supra genu exo-
stosibus quasi tumens sentiebatur, post alia medicamenta
incaſsum tentata, mercurius dulcis in usum vocatur. Vix
hujus duodecim granis consumtis, vehemens suborta est
salivatio, quam tamen, post quatuordecim dies, coërce-
re poterant idonea medicamenta.

Gravior indies dolor exstitit, & tumor perfectam in-
flammationis speciem induit. Quæ e re visa sunt medi-
camina, inflammationis quidem signa decedere sensim jus-
serunt, sed in affecta parte scindentes passim dolores ac-
ponderis sensum, & vagos, per universum corpus, hor-
ro-

rores pati se ægra querebatur: fluctuatio etiam in affecto loco tactu percipi credebatur: tumori adhibitum est causticum salinum Pharmacopœæ Svericæ, & post quinque dies excidebatur. escharra; ex ulcere, puris loco, fungosa caro pullulavit & foetens sanies copiose exhibat. Injectiones acidi salis diluti factæ, & ulceri camphora cum assa foetida, quo insignis putredo continuo aucta minueretur, imponebatur: spe autem omnis curationis amissa; admonebatur misera, ut amputatione servari se pateretur: brevi vero non permisit indies auctus & diffusior jam tumor, ut operatio hæc posset tentari, quam, jam altius sese extendens caries, quod vereri suberat, inutilem redderet. Resolventia igitur externa & cardiaca lenia interna, sed sine omni fructu, adhibebantur: minuebantur vires, accessit hectica febris, fungus, magnitudinem infantilis capitis habens, ex ulcere exuberabat, pars affecta magis magisque intumuit, ægræ vero dies decimus sextus Maji supremus erat.

Post mortem ipsa articulatio in genu nihil vitiosi præ se ferebat: extremitas vero inferior femoris a reliquo osse omnino dissoluta, & ita in latus detorta, ut cum condylis angulum formaret. Condyli turgidi, fere cavi, ichore impleri. Periostium a feminis osse separatum ad medium usque: muscoli circumjacentes in liquamen putridum resoluti.

Obs. I. Dolor, quo ante infortunium genu afficiebatur, & fractura, quam in osse adeo crasso levior luxatio efficere valuit, satis ostendunt, antea localem hic adfuisse ossis morbum, quod insuper evidentissime confirmat absentia omnis calli, qui alioquin per quatuor hebdomadas formari debuisset.

Obs. II. Signa suppurationis interdum valde esse fallacia, vel ex hoc casu patet.
